



Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
 Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	3-5 ml auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben (Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Daumen nicht vergessen), während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit C 20 tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen, dann Hände wie gewohnt desinfizieren	<ul style="list-style-type: none"> nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z. B. Blut) und Ausscheidungen (z. B. Wickeln) nach dem Ablegen von Handschuhen nach Toilettenbenutzung bei Durchfallerkrankungen nach Umgang mit infektiös erkrankten Kindern nach Reinigungsarbeiten im Sanitärbereich vor/ nach Arbeiten mit rohem Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch, Eiern 	Betreuungsmitarbeiter
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> bei Dienstbeginn, nach Toilettenbenutzung vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. der Nahrungsaufnahme nach Tierkontakt bei optischer Verschmutzung 	Betreuungsmitarbeiter/ Kinder
Auch Kinder sollten eine ordnungsgemäße Handwaschtechnik erlernen.				
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	bei Bedarf	Betreuungsmitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschuttschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> 2-3 mal täglich bei Bedarf vor dem Tragen von Einmalhandschuhen 	Betreuungsmitarbeiter
 Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (z. B. Wickeltische, -auflagen, Säuglingswaagen) Spielgeräte, sonstige Gegenstände	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen nach Benutzung durch ein infektiös erkranktes Kind 	Betreuungsmitarbeiter
Toiletten und sanitäre Einrichtungen (z.B. Waschbecken, Armaturen, Toilettenaufsätze) Töpfchen Windeleimer	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	mit Tuch gründlich wischdesinfizieren, einwirken lassen, Sitzflächen mit klarem Wasser und sauberem Tuch nachwischen Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen, Sitzflächen mit klarem Wasser und sauberem Tuch nachwischen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen nach Benutzung durch ein an Durchfall erkranktem Kind bei Ausbruchsgeschehen 1x täglich 	Betreuungsmitarbeiter/ Reinigungsmitarbeiter
(Baby-) Badewannen, Duschanne	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	mit Tuch gründlich wischdesinfizieren, einwirken lassen, mit klarem Wasser und sauberem Tuch nachwischen Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen, mit klarem Wasser und sauberem Tuch nachwischen	nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen	Betreuungsmitarbeiter/ Reinigungsmitarbeiter
Fieberthermometer	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen, mit klarem Wasser und sauberem Tuch nachwischen	nach Benutzung	Betreuungsmitarbeiter
Sonstige kleine Flächen z. B. Türgriffe, Handgriffe	B 60 Desinfektionstücher 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen	Betreuungsmitarbeiter/ Reinigungsmitarbeiter
Textiles Spielzeug, Bezüge	Waschmaschine	desinfizierend waschen	bei Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen	Betreuungsmitarbeiter

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen, um der Überwachungspflicht zu genügen (BGR 250/TRBA 250, Punkt 5.2 und 4.1.2.3). Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit Handschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum

Dosiertabelle für B 15 Wischdesinfektion

(zur Herstellung einer 2%igen Gebrauchslösung; 1 Dosierkopf = 20 ml)

Gebrauchslösung ↓	Anzahl Füllungen Dosierkopf
1 Liter	1
2 Liter	2
3 Liter	3
4 Liter	4
5 Liter	5

Gebrauchslösung ↓	Anzahl Füllungen Dosierkopf
6 Liter	6
7 Liter	7
8 Liter	8
9 Liter	9
10 Liter	10

Beispiel zur Herstellung von 5 Litern Gebrauchslösung:

Eimer mit klarem, kaltem Wasser bis zur 5-Liter-Markierung auffüllen. Dosierkopf auf die B15-Flasche schrauben. Durch Drücken der Flasche den Dosierkopf bis zur 20 ml-Markierung füllen. Fünf Dosierkopf-Füllungen B 15 Wischdesinfektion in den Eimer geben. Gut umrühren!

Nicht mit anderen Reinigern mischen.