

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
Das Tragen von Schmuck/Uhren an Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet! Fingernägel kurz und sauber halten!				
 Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen	- bei Dienstbeginn und -ende, nach Pausen und Toilettenbesuch - vor/ nach pflegerischen Tätigkeiten - vor Kontakt mit immungeschwächten Personen - nach Kontakt mit infektiösem/n Personen/ Material - nach dem Ablegen von Handschuhen - vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme	Alle Mitarbeiter
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender (2 ml) gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	- bei Bedarf - nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung	Alle Mitarbeiter
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- bei Bedarf	Alle Mitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschutzschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Einmalhandschuhen	Alle Mitarbeiter
Hautdesinfektion	C 20 Hände + Haut Desinfektion 100%, 30 Sek.	aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trockenreiben, 30 Sek. einwirken lassen	- vor Injektionen und Punktionen aller Art	Medizinisches Personal
Ganzkörperwaschung (Besiedelung mit multiresistenten Erregern)	C 30 Hygienische Waschlotion 100 %, 30 Sek., begrenzt viruzid	Für antimikrobielle Körperwaschung Entnahme an die zu behandelnde Hautfläche anpassen. Entnahme direkt aus der 400-ml-Flasche oder aus geeignetem Präparatespender.	- Ganzkörperwaschung (inkl. Kopfhaar) bei Besiedelung mit MRSA oder anderen multiresistenten Erregern	Medizinisches Personal
Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten!				
 Medizinische Geräte, Arbeitsflächen, Einrichtungsgegenstände (Bettgestelle, Mobiliar etc.)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf - nach Kontamination sofort	Pflegepersonal/ Hauswirtschaftspersonal
Nacht- und Rollstühle, Verbands- und Pflegewagen, Tragen, Liegen etc. Matratzenüberzüge (flüssigkeitsdicht)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- bei Bedarf	Pflegepersonal/ Hauswirtschaftspersonal
Toiletten und sanitäre Einrichtungen Badewannen, Duschwannen, Waschsüsseln	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf - nach jeder Benutzung	Reinigungspersonal
Fieberthermometer, Stethoskope, Blutdruckapparate, Blutzuckermessgeräte etc.	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach jeder Benutzung	Pflegepersonal
Sonstige kleine Flächen Türgriffe, Tablett für Injektionsspritzen und Medikamente, etc.	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach Kontamination - bei Bedarf	Pflegepersonal/ Hauswirtschaftspersonal
Steckbecken, Urinflaschen, Toilettenstühle, etc.	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	für manuelle Desinfektion: entleeren, in Desinfektionslösung einlegen oder wischdesinfizieren, einwirken lassen	- direkt nach Gebrauch	Pflegepersonal
Fußböden	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf	Reinigungspersonal
 Instrumente allgemeine, chirurgische Instrumente	A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 15 Min.	Manuelle Instrumentenaufbereitung: - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen - ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen	- direkt nach Gebrauch	Pflegepersonal
 Absauggeräte	D 10 Absauggerätedesinfektion 2 %, 1 Stunde	Vor Gebrauch 10 – 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch Schlauch saugen. 1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in D 10-Gebrauchslösung einlegen, einwirken lassen, mit Wasser spülen. Gerät äußerlich mit D 10-Lösung wischdesinfizieren, einwirken lassen.	- vor Gebrauch - direkt nach Gebrauch - 1 x täglich	Pflegepersonal

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen, um der Überwachungspflicht zu genügen (BGR 250/TRBA 250, Punkt 5.2 und 4.1.2.3). Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit Handschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Zuständig:

Ort, Datum