

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
 <b>Desinfizierende hygienische Händewaschung</b>	<b>C 30 Hygienische Waschlotion</b> 100%, 30 Sek.	Hände mit kaltem Wasser anfeuchten und 1 Hub aus Spender (2 ml) während 30 Sek. in Hände einreiben, entstandenen Schaum abwaschen und mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen</li> <li>– nach dem Umgang mit kritischen Lebensmitteln wie Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei</li> </ul>	Alle Mitarbeiter/ Schüler
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<b>HD 410 Händedesinfektion</b> 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	3-5 ml auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben (Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Daumen nicht vergessen), während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten <b>bei groben Verschmutzungen:</b> Zellstofftuch mit C 20 tränken und die Verschmutzungen <b>vorab</b> entfernen, dann Hände wie gewohnt desinfizieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z. B. Blut) und Ausscheidungen (z. B. Erbrochenem, Stuhl, Urin)</li> <li>– nach Toilettenbenutzung bei Durchfallerkrankungen</li> <li>– nach Umgang mit infektiös Erkrankten</li> <li>– nach Reinigungsarbeiten im Sanitärbereich</li> <li>– nach dem Ablegen von Handschuhen</li> <li>– vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen</li> </ul>	Alle Mitarbeiter/ Schüler
<b>Händereinigung</b>	<b>C 45 Waschlotion</b> 100%	Hände mit kaltem Wasser gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Schulbeginn, nach Toilettenbenutzung</li> <li>– vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. der Nahrungsaufnahme</li> <li>– vor der Einnahme von Speisen</li> <li>– nach Tierkontakt</li> <li>– bei optischer Verschmutzung</li> <li>– nach Reinigungsarbeiten</li> </ul>	Alle Mitarbeiter/ Schüler
<b>Auch Kinder sollten eine ordnungsgemäße Handwaschtechnik erlernen.</b>				
<b>Händepflege</b>	<b>C 50 Pflegelotion</b> 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	– bei Bedarf	Alle Mitarbeiter
<b>Hautschutz</b>	<b>C 60 Hautschuttschaum</b> 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-3 mal täglich</li> <li>– bei Bedarf</li> <li>– vor dem Tragen von Einmalhandschuhen</li> </ul>	Alle Mitarbeiter
 <b>Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (z. B. Tische, Stühle, Schränke, Regale)</b>  <b>Spielgeräte, sonstige Gegenstände</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. <b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) <b>B 60 Desinfektionstücher</b> 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen  entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen  Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen</li> <li>– bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich</li> <li>– nach Benutzung durch ein infektiös erkranktes Kind</li> </ul>	Personal
<b>Flächen zur Verarbeitung von Lebensmitteln</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	gründlich reinigen und desinfizieren, einwirken lassen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 - 2 x täglich</li> <li>– nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln (Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei)</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>	Personal
<b>Fieberthermometer</b>	<b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen	– nach Benutzung	Personal
<b>Sonstige kleine Flächen (z. B. Türgriffe, Handläufe)</b>	<b>B 60 Desinfektionstücher</b> 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen</li> <li>– bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich</li> </ul>	Personal/ Reinigungsmitarbeiter
<b>Toiletten und sanitäre Einrichtungen (z.B. Toilettenbrillen, Waschbecken, Armaturen)</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. <b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) <b>B 60 Desinfektionstücher</b> 100 %, 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	mit Tuch gründlich wischdesinfizieren, einwirken lassen, Sitzflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen  Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen, Sitzflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen  Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen</li> <li>– bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich</li> </ul>	Personal/ Reinigungsmitarbeiter
<b>Fußböden in Umkleide-, Wasch- und Duschanlagen</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	Reinigungspersonal
<b>Textiles Spielzeug, Bezüge</b>	<b>Waschmaschine</b>	desinfizierend waschen	bei Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen	Personal

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden und vor dem Zugriff von unberechtigten Personen sicher aufbewahren. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum