

ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ КЛИНИК



- Операционные отделения

Превосходная система защиты!

ОГО®
Hygienesystem



Область применения	Препарат Концентрация, Время экспозиции	Способ обработки	Частота применения	Ответственный
ВНИМАНИЕ! Запрещено во время работы иметь на руках украшения/часы ! Ногти на руках должны быть короткими и чистыми !				
 Гигиеническая дезинфекция рук	С 20 дезинфекция рук и кожи 100%, 30 сек. (Noro-вирусы 5 мин.)	нанести на сухие руки 3-5 мл. средства (2 нажатия на диспенсер), тщательно втереть При сильном загрязнении: смочить салфетку дезинфицирующим препаратом для рук и предварительно удалив загрязнение, обработать руки	– перед началом и по завершению работы – после каждого вмешательства – после контакта с инфицированными пациентами-, секретом или материалом – после снятия защитных перчаток – перед перерывом, приема пищи	Все сотрудники
Очищение рук	С 45 Лосьон для мытья рук 100%	тщательно вымыть руки холодной водой и используя 2 мл. средства (1 нажатие диспенсера), и вытереть одноразовой салфеткой	– после гигиенической дезинфекции рук – при видимом загрязнении	Все сотрудники
Мытье рук	С 45 Лосьон для мытья рук 100%	1 нажатие диспенсера (2 мл) подать на смоченные холодной водой руки, вспенить и тщательно вымыть руки и предплечье согласно стандарту-мытья 1 Min., затем ополоснуть холодной водой и высушить одноразовой салфеткой, по завершению произвести хирургическую дезинфекцию рук	– перед минимальном хирургическом МІС – перед хирургическими вмешательствами	Врач, медперсонал
Хирургическая дезинфекция рук	С 20 дезинфекция рук и кожи 100%, 30 сек. (Noro-вирусы 5 мин.)	полностью смочить сухие руки и предплечья и согласно стандартному методу втирания тщательно втирать, на протяжении всего времени экспозиции держать их во влажном состоянии		
Уход за руками	С 50 Лосьон для ухода 100%	небольшое количество лосьона (величиной с горошину) втереть в сухие, чистые руки	несколько раз в день, на перерыве, при необходимости	Все сотрудники
Дезинфекция кожных покровов (пациента)	С 20 Дезинфекция рук и кожи 30 сек.	– нанести дезсредство на обрабатываемую поверхность и дать высохнуть или нанести на тампон, смочить кожу оставить на 30 сек. для воздействия! – насыщенно оросить и протереть стерильным тампоном, повторно оросить	– перед инъекциями и пункциями – перед медицинскими вмешательствами	Врач, медперсонал
Следить за обесчещенным состоянием приборов !				
 Медицинско-техническое оборудование (наркозное-, аспирационное-, О2-оборудование, монитор, кабель, электроды и.т.д)	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы: 1 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата либо использовать для протирки пропитанную салфетку или оросить и протереть, оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	– после каждого использования – 1 х ежедневно придерживаться инструкции по дезинфекции производителя оборудования	Медперсонал
Рабочие поверхности, предметы оснащения (столы для инструментов, ОП-стол, ОП-лампы и.т.д)	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы: 1 мин.)	тщательно обработать поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	– при смене пациентов – при необходимости	Хозяйственный персонал, Обслуживающий медперсонал
Танометры, стетоскопы, термометры, и.т.д	В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы: 1 мин.)	пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	после каждого использования	Обслуживающий персонал
Прочие малые поверхности (ручки дверей, ручки ламп и.т.д)	В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы: 1 мин.)	пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	– сразу после контаминации – при необходимости	Хозяйственный персонал/ Обслуживающий медперсонал
Полы, стены	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин.	надлежащим влажным методом дезинфицировать и очистить, оставить для воздействия	– при смене пациента – 1 х ежедневно – при необходимости	Санитарка
Контейнер для отходов	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы: 1 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	– при видимой контаминации – 1 х в неделю	Санитарка

Область применения	Препарат Концентрация, Время экспозиции	Способ обработки	Частота применения	Ответственный
 Инструменты общие, хирургические	A 20 Дезинфекция инструментов 2%, 15 мин.	ручная подготовка инструментов: – для очистки и дезинфекции погрузить инструменты в готовый препарат А 20 – следить за их полной смачиваемостью – оставить для воздействия – при необходимости доочистить и повторно погрузить в дезраствор – тщательно промыть водой – просушить и загрузить в автоклав	– сразу после использования	Врач, медперсонал
 Аспирационные системы	D 10 Дезинфекция аспирационных машины 2%, 1 час.	перед использованием налить 10 – 20 мл. концентрата в приемную емкость аспирационного аппарата. После каждого применения пропустить готовый препарат D 10 через шланг. 1 x ежед. контаминированные части (емкости, шланги и т.д.) погрузить в раствор, дать воздействовать, тщательно промыть водой.	– сразу после использования – 1 x ежедневно	Врач, медперсонал
Медицинские одноразовые инструменты (шприцы, иглы канюли и т.д)	Надежный от прокалывания контейнер с плотной крышкой	Травмобезопасная утилизация (не надевать на готовые шприцы и канюли колпачки)	сразу после использования	Врач, медперсонал
Рабочая одежда медперсонала	-прачечная	– стирать с использованием специальных дезинфицирующих средств – хранить отдельно от уличной одежды – собирать в бельевые мешки – наполненные бельевые мешки плотно закрывать – ОП-одежду стерилизовать, хранить запечатанной	– ежедневно – при видимом загрязнении или при сильной контаминации немедленно	Врач, медперсонал
Контаминированная защитная одежда, ОП-салфетки и т.д	-прачечная -стерилизатор			

Этот план дезинфекционных работ необходимо адаптировать пользователем согласно последнему стандарту техники и внутренним условиям. Рекомендуется проведение постоянного обучения персонала и письменная документация для проведения контроля согласно. При использовании дезинфицирующих средств мы рекомендуем работать пригодными защитными перчатками. Дезинфицирующие средства правильно использовать. Перед применением всегда читать инструкцию. Спиртосодержащие препараты не использовать на чувствительных к спиртам поверхностях как напр. **акриловое стекло**

Ответственный:

Место, дата