

Область применения	Препарат Концентрация, Время экспозиции	Способ обработки	Частота применения	Ответственный
ВНИМАНИЕ! Запрещено во время работы иметь на руках украшения/часы ! Ногти на руках должны быть короткими и чистыми !				
 Гигиеническая дезинфекция рук	С 20 дезинфекция рук и кожи 100%, 30 сек. (Noro-вирусы 5 мин.)	нанести на сухие руки 3-5 мл. средства (2 нажатия на диспенсер), тщательно втереть При сильном загрязнении: смочить салфетку дезинфицирующим препаратом для рук и предварительно удалив загрязнение, обработать руки	<ul style="list-style-type: none"> - перед началом и по завершению работы - перед инъекциями, пункциями всех видов - перед подготовкой к инфузии приготвление смешанной инфузии, подготовка медикаментов - до и после контакта с венозными катетерами и дренажами - после контакта с инфицированными пациентами - контакта с инфицированным материалом, поверхностями, предметами (мочеприемниками), аспирационными аппаратами и.т.д.) - после снятия защитных перчаток - перед перерывом, приема пищи - после посещения туалета - после сморкания и чихания 	Все сотрудники
Очищение рук	С 45 Лосьон для мытья рук 100%	тщательно вымыть руки холодной водой и используя 2 мл. средства (1 нажатие диспенсера), и вытереть одноразовой салфеткой	<ul style="list-style-type: none"> - при необходимости, - после гигиенической дезинфекции рук - при видимом загрязнении 	Все сотрудники
Уход за руками	С 50 Лосьон для ухода 100%	небольшое количество лосьона (величиной с горошину) втереть в сухие, чистые руки	при необходимости	Все сотрудники
Дезинфекция кожных покровов (пациента)	С 20 Дезинфекция рук и кожи 30 сек.	<ul style="list-style-type: none"> - нанести дезсредство на обрабатываемую поверхность и дать высохнуть или нанести на тампон, смочить кожу оставить на 30 сек. для воздействия! - насыщенно оросить и протереть стерильным тампоном, повторно оросить 	<ul style="list-style-type: none"> - перед инъекциями и пункциями - перед медицинскими вмешательствами 	Врач или медперсонал
Следить за обесточенным состоянием приборов !				
 Медицинско-техническое оборудование (аспирационные аппараты, перфузоры, инфузоматы, монитор, кабель, электроды и.т.д.)	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы 1 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата либо использовать для протирки пропитанную салфетку или оросить и протереть, оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	<ul style="list-style-type: none"> - после каждого использования - 1 х ежедневно придерживаться инструкции по дезинфекции производителя оборудования	Обслуживающий медперсонал
Медицинские кабинеты, перевязочные рабочие поверхности шкафов полок для медикаментов и.т.д	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы 1 мин.)	тщательно обработать поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	<ul style="list-style-type: none"> - 1 х ежедневно - сразу после контаминации - при необходимости 	Хозяйственный персонал
Предметы оснащения (больничная койка, тумбочки столы, стулья и.т.д), личные предметы пациентов (коляски и.т.д)	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулоцидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы 1 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия, систему шлангов загрузить в стерилизатор пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	<ul style="list-style-type: none"> - 1 х ежедневно - сразу после контаминации - при необходимости 	Хозяйственный персонал/ Обслуживающий медперсонал
Предметы медицинского назначения (термометры, стетоскопы, танометры и наконечники.т.д.)	В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.) В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы 1 мин.)	пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	после каждого использования	Обслуживающий медперсонал
Прочие малые поверхности (ручки дверей, лотки, и.т.д)	В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Noro-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.)	смочить поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	<ul style="list-style-type: none"> - 1 х еженедельно - сразу после контаминации 	Хозяйственный персонал
	В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Noro-вирусы 1 мин.)	тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия		

Область применения	Препарат Концентрация, Время экспозиции	Способ обработки	Частота применения	Ответственный
Полы, стены	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин.	надлежащим влажным методом дезинфицировать и очистить, оставить для воздействия	- 1 х ежедневно - сразу после контаминации	Санитарка
Туалеты, стульчак и санузлы, вспомогательные приспособления, и.т.д	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 30 Быстрая дезинфекция 100%, 2 мин. (Ного-вирусы: 1 мин./ полная вирулицидность: 5 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата пропитать препаратом салфетку и обработать поверхность, либо оросить обрабатываемую поверхность оставить для воздействия	- 1 х ежедневно - при видимой контаминации	Санитарка
Контейнер для отходов	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин. В 60 Дезинфицирующие салфетки 100%, 15 сек. (Ного-вирусы 1 мин.)	тщательно смочить поверхность салфеткой, оставить для воздействия на время, в зависимости от концентрации приготовленного препарата тщательно обработать поверхность дезинфицирующей салфеткой, оставить для воздействия	- при видимой контаминации - 1 х в неделю	Санитарка обслуживающий персонал
Холодильник	В 15 Дезинфекция методом протирания 0,5%, 1 час./ 1%, 15 мин./ 2%, 5 мин./ 3%, 2 мин./ полная вирулицидность: 2%, 15 мин.	Утилизировать просроченные продукты питания, тщательно очистить стены и полки, обработать дезраствором, оставив для воздействия. Тщательно промыть водопроводной водой	1 х еженедельно и при необходимости	Хозяйственный персонал
 Инструменты общие, хирургические	A 20 Дезинфекция инструментов 2%, 15 мин.	ручная подготовка инструментов: - для очистки и дезинфекции погрузить инструменты в готовый препарат А 20 - следить за их полной смачиваемостью - оставить для воздействия - при необходимости доочистить и повторно погрузить в дезраствор - тщательно промыть водой - просушить одноразовой салфеткой или пистолетом - обработанный инструмент хранить в выдвижном ящике или закрытом контейнере при необходимости автоклавировать	сразу после использования	Обслуживающий персонал
 Аспирационные системы	D 10 Дезинфекция аспирационных машины 2%, 1 час	перед использованием налить 10 – 20 мл. концентрата в приемную емкость аспирационного аппарата. После каждого применения пропустить готовый препарат D 10 через шланг. 1 х ежед. контаминированные части (емкости, шланги и.т.д.) погрузить в раствор, дать воздействовать, тщательно промыть водой.	- сразу после использования - 1 х ежедневно	Обслуживающий персонал
Медицинские одноразовые инструменты (шприцы, иглы канюли и.т.д)	Надежный от прокалывания контейнер с плотной крышкой	Травмобезопасная утилизация (не надевать на готовые шприцы и канюли колпачки)	сразу после использования	Обслуживающий персонал
Грязное бельё (постельное белье, полотенца, сорочки, пижамы и.т.д)	предлагаемая в торговле стиральная машина	- собирать в бельевых мешках, транспортных тележках - стирать с использованием специальных дезинфицирующих средств	- 3 х в неделю - в зоне с повышенным инфекционным риском ежедневно - сразу после контаминации	Сестра-хозяйка, санитарка
Рабочая одежда медперсонала	предлагаемая в торговле стиральная машина	- хранить отдельно от уличной одежды - стирать с использованием специальных дезинфицирующих средств	- 3 х в неделю - в зоне с повышенным инфекционным риском ежедневно - сразу после контаминации	Специализированные прачечные
Контаминированная защитная одежда	предлагаемая в торговле стиральная машина	- стирать с использованием специальных дезинфицирующих средств	- после контакта с кровью, выделениями пациента	Уборка чужим трудом
Защитные маски, перчатки, головные колпаки	одноразовые изделия	- надежно запаковано в отходы	- мероприятия по уходу за пациентами с подозрением на инфекционные заболевания - смена повязки с больших септических поверхностией ран - мероприятия по уходу за пациентами с ослабленным иммунитетом (обратная изоляция)	
Посуда, столовые приборы	Предлагаемая в торговле посудомоечная машина	загрузить в посудомоечную машину	После использования	Сотрудники больничных пунктов питания

Этот план дезинфекционных работ необходимо адаптировать пользователем согласно последнему стандарту техники и внутренним условиям. Рекомендуется проведение постоянного обучения персонала и письменная документация для проведения контроля согласно. При использовании дезинфицирующих средств мы рекомендуем работать пригодными защитными перчатками. Дезинфицирующие средства правильно использовать. Перед применением всегда читать инструкцию. Спиртосодержащие препараты не использовать на чувствительных к спиртам поверхностях как напр. **акриловое стекло**

Ответственный:

Место, дата