


Ausstattung und Maßnahmen bei Infektionskrankheiten

Folgendes bereitstellen:



B 15 Wischdesinfektion mit Dosierkopf, B 40 Schnelldesinfektion, C 20 Hände + Haut Desinfektion, Schutzhandschuhe, Müllbeutel, Einwegtücher, Schwammtücher, 10-L-Eimer in einer geschlossenen Box.



Anwendung:

- Zur Unterbrechung der Übertragungswege bei Infektionskrankungen
- Beseitigung von Verschmutzungen durch Ausscheidungen oder Körperflüssigkeiten (z.B. Blut)

Schritt 1: Grobe Verschmutzungen entfernen



Herstellerhinweise beachten. Schutzhandschuhe anziehen.



Verschmutzungen (z.B. Blut, Erbrochenes, Stuhl) mit trockenen Einwegtüchern aufwischen. Benutzte Tücher und Handschuhe in bereitgestellte Müllbeutel entsorgen.

Schritt 2: Fläche desinfizieren



Für große Flächen:

B 15 Wischdesinfektion (2%ige Lösung). Neue Schutzhandschuhe anlegen. Eimer mit Wasser füllen und Konzentrat **It. Dosiertabelle** dazugeben, gut umrühren. Schwammtuch mit Gebrauchslösung benetzen und die Fläche wischen,



B 15 Wischdesinfektion - Forts. 5 Min. einwirken lassen. Benutztes Tuch nicht wieder in die Lösung eintauchen, nach Gebrauch entsorgen.



Spielsachen, die in den Mund genommen werden, sowie Haut und Lebensmittel berührende Flächen nach der Einwirkzeit mit Trinkwasser und sauberem Tuch nachwischen oder -spülen.



Für kleine Flächen:

B 40 Schnelldesinfektion

Neue Schutzhandschuhe anlegen. B 40 Schnelldesinfektion unverdünnt auf ein Tuch oder direkt auf die Fläche geben und wischen, **1 Min. einwirken** lassen. Trocknet rückstandsfrei auf, kein Nachwischen.

Schritt 3: Nicht vergessen



Händehygiene

C 20 Hände + Haut Desinfektion

Produkt in die trockenen Hände geben kräftig verreiben und 30 Sek. lang feucht halten. Dabei Fingerzwischenräume, -kuppen, Nagelfalzen und Daumen nicht vergessen.



Gilt immer:

Benutzte Tücher und Schutzhandschuhe in den Müllbeutel geben, diesen fest verschlossen mit dem Hausmüll entsorgen. Eimer ausspülen, trocknen.

- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Nach Gebrauch Desinfektionsmittel und Utensilien wieder in die Box packen, diese fest verschließen und **kindersicher aufbewahren**.
- Einzelheiten zu den Desinfektionsmaßnahmen finden Sie im Desinfektionsplan.
- **Nicht anwenden:** B 15 Wischdesinfektion auf Linoleum oder Aluminium/B 40 Schnelldesinfektion auf Acrylglas oder in der Nähe von Zündquellen/C 20 Hände + Haut Desinfektion auf Wunden

C 20 - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
(Biozid-Reg-Nr.: B 15: N-21253/N-17630; B 40: N-21259/N-21261).